

Data:

Godzina:

Lekarz:

7 dni przed planowanym badaniem należy po uprzedniej konsultacji z lekarzem odstawić:

- leki przeciwkrzepliwe np.: Sintrom, Acard, Polopiryna, Aspiryna, Ticlo;
- leki przeciwplatekcyjne np.: Plavix, Xarelto.

4 dni przed planowanym badaniem należy nie spożywać:

- warzyw i owoców pestkowych,
- pestek (siemię lniane, mak, słonecznik itp.),
- ciemnego pieczywa,
- napojów gazowanych.

Zalecane: dieta półpłynna, jogurty, galaretki, kisiele, gotowane mięso i ryby, ryż, makaron, herbata, woda mineralna niegazowana.

Oczyszczanie

Jeśli badanie jest w godzinach porannych, w przeddzień badania należy wykonać pełne oczyszczenie preparatem zleconym na receptę (np. Fortrans, Moviprep) przez lekarza (np. POZ) i wg jego zaleceń; jeśli badanie jest w godzinach po 15:00 oczyszczenie należy rozłożyć na dwa dni i jedną dawkę zażyć rano w dniu badania. Od momentu rozpoczęcia oczyszczania należy już nie jeść – można pić wodę.

W dniu badania w znieczuleniu ogólnym należy pozostać minimum 5 godzin na czczo (bez picia i jedzenia).

Na badanie **należy przynieść wyniki** poprzednich kolonoskopii i/lub badań dodatkowych.