

ZNIECZULENIE PORODU

W naszym Szpitalu oferujemy pacjentkom znieczulenie zewnątrzoponowe (regionalne) porodu. Decyzję o znieczuleniu podejmują wspólnie pacjentka, ginekolog - położnik i anestezjolog. Znieczulenie porodu wykonujemy w aktywnej fazie I okresu porodu, przy rozwarciu szyjki macicy 3-5 cm. Poprzedza je badanie pacjentki i wykluczenie przeciwwskazań do znieczulenia. Metoda ta polega na wprowadzeniu cienkiego cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, w pozycji siedzącej lub leżącej na boku. Przez cewnik podawane są leki znieczulające w zależności od przebiegu porodu i odczuwania bólu przez rodzącą. Ideą znieczulenia zewnątrzoponowego jest jak największe zniesienie odczucia bólu przy skurczach macicy, a jednocześnie jak najmniejsze zaburzenie czynności skurczowej. Podawane leki łagodzą ból porodowy, ale nie znoszą go całkowicie. Leki znieczulające zaczynają działać po około 20 min po podaniu.

Możliwe powikłania i działania niepożądane znieczulenia zewnątrzoponowego:

- spadek ciśnienia tętniczego odczuwany jako zawrót głowy, nudności, wymioty
- przebicie opony twardej i możliwość wystąpienia zespołu popunkcyjnego (ból głowy)
- bóle kręgosłupa
- świąd skóry
- przejściowe podrażnienie nerwów objawiające się zaburzeniami czucia, mrowieniem lub osłabieniem kończyn
- niepełne zniesienie bólu

Szczegółowych informacji o znieczuleniach udziela anestezjolog podczas konsultacji, którą najlepiej odbyć 2-3 tygodni przed porodem.